Объявление № 7
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2023 год

г. Атырау **22.05.2023 г.**

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2023 год в соответствии с Постановления Правительства РК № 375 от 04.06.2021 г. «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила).

Месторасположение заказчика, организатора закупа: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412.

Товар поставляется: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412, КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» УЗ АО.

Сроки и условия поставки: согласно графика договора закупа, на условиях DDP, по ИНКОТЕРМС 2020.

Место представления и окончательный срок подачи ценовых предложений (документов) от потенциальных поставщиков: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412 (здание КГП на ПХВ «Атырауская областная больница№2» УЗ АО, административный корпус, 3 этаж), прием по 29.05.2023 г., до 12:30 ч включительно.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями (заявками): 29.05.2023 г., в 12:30 ч, в кабинете отдел гос. закуп.

Конверт должен содержать ценовые предложения, разрешение, подтверждающее права потенциального поставщика на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

На конверте должно быть указано:

1) Полное наименование потенциального поставщика;
2) Юридический и фактический адреса потенциального поставщика;
3) Номер телефона (ов);
4) На конверте также должно быть прописано: «По объявлению ЗЦП № 7 от 22.05.2023 г.»

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой его выражения согласия осуществить поставку с соблюдением условий настоящего запроса. Представляемые расходные материалы и медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в настоящем запросе (объявлении).

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Кр. описание	Ед. изм.	Общее кол-во	Цена объявл.	Общая сумма	График поставок
		На биохимичекий аппарат « Dimension»					
1	TBIL - Total Bilirubin 8 Flexes 480 (Реагент для определения общего билирубина 4 флекса 480) , набор	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения общего билирубина в человеческой сыворотке и плазме. Измерения общего билирубина используются при диагностике и лечении заболеваний печени, гемолитических заболеваний, заболеваний крови и нарушений обмена веществ, включая гепатит и заболевание желчного пузыря.Состав: ацетатный буферный раствор,кофеин,натрия бензоат,Динатрий EDTA,кислота сульфаниловая,кислота соляная,натрия нитрит. Принцип процедуры: Диазотированная сульфаниловая кислота образуется при соединении натрия нитрита и сульфаниловой кислоты при низком pH. Билирубин (непрямой) в образце растворяется путем разведения в смеси кофеина/бензоата/ацетата/EDTA. При добавлении диазотированной сульфаниловой кислоты растворенный билирубин, включая прямой билирубин (монои диглюкуронид) и дельта-форму4 (билипротеин-билирубин, ковалентно связанный с альбумином), превращается в диазотированный билирубин — красный хромофор, представляющий собой общий билирубин, который поглощает свет при длине волны 540 нм; его измеряют с бихроматически с конечной точкой (540, 700 нм). Используется коррекция по холостому образцу. Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней.Стабильность в открытой лунке: 5 дней для лунок 1, 4–6, 3 дня для лунки 3, 15 дней для лунки 2 (диазотированная сульфаниловая кислота, образованная путем автоматического добавления натрия нитрита из лунки). Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0,1–25,0 мг/дл [2–428 мкмоль/л]. Аналитическая чувствительность: 0,1 мг/дл [2 мкмоль/л]. В упаковке 480 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского	набор	6	45 500	273 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
2	DBIL - Direct Bilirubin 8 Flexes 320 (Реагент для определения прямого билирубина 8 флекса 320) , набор	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения прямого (конъюгированного) билирубина в человеческой сыворотке и плазме. Измерения прямого билирубина используются при диагностике и лечении заболеваний печени, гемолитических заболеваний, заболеваний крови и нарушений обмена веществ, включая гепатит и заболевание желчного пузыря. Состав:нитрат натрия,соляная кислота,сульфаниловая кислота.Принцип процедуры: Диазотированная сульфаниловая кислота образуется при соединении натрия нитрита и сульфаниловой кислоты при низком pH. Образец разводят в 0,5 М HCl. Производится измерение холостого раствора, чтобы исключить мешающее влияние небилирубиновых красящих веществ. При добавлении диазотированной сульфаниловой кислоты прямой билирубин превращается в диазотированный билирубин — красный хромофор, — который поглощает светпри длине волны 540 нм; его измеряют бихроматически с конечной точкой (540, 700 нм). Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки остаются стабильными в анализаторе на протяжении30 дней. Стабильность в открытой лунке: 2 дня для лунок 1–4 (после приготовления диазотированной сульфаниловой кислоты) 30 дней для лунок 5–8. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0,05–16,0 мг/дл [0,86–274 мкмоль/л]. В упаковке 320 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	набор	6	41 500	249 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

3	ALT - ALT/GPT 4 Flexes 240 (Реагент для определения ALT/GPT 4 флекса 240), упак	Диагностический тест in vitro для количественного измерения активности аланинаминотрансферазы в человеческой сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Измерения аланинаминотрансферазы используются при диагностике и лечении определенных заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Принцип процедуры: аланинаминотрансфераза катализирует трансаминирование от L-аланина к α-кетоглутарату (α-KG) с образованием L-глутамата и пирувата. Формируемый пируват восстанавливается до лактата лактатдегидрогеназой с одновременным окислением восстановленного никотинамидадениндинуклеотида. Изменение оптической плотности прямо пропорционально активности аланинаминотрансферазы и измеряется с использованием бихроматического(340, 700 нм) метода. Хранить при: 2–8°C. Запечатанные или негидратированные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6, 30 дней для лунок 7–8. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 6–1000 ЕД/л [0,10–16,70 мккат/л]. В упаковке 240 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	упак	6	22 500	135 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
4	AST - AST/GOT 4 Flexes 360 (Реагент для определения AST/GOT 4 флекса 360), упак	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в человеческой сыворотке или плазме.Состав: MDH,LDH,NADH,P5P,буферный раствор,аспарагиновая кислота,α-кетоглутаровая кислота.Принцип процедуры: Аспартатаминотрансфераза (AST) катализирует трансаминирование от L-аспартата к α-кетоглутарату с образованием L-глутамата и оксалоацетата. Образовавшийся оксалоацетат восстанавливается до малата малатдегидрогеназой с одновременным окислением восстановленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH). Изменение оптической плотности во времени вследствие преобразования NADH в NAD прямо	упак	4	33 500	134 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		пропорционально активности AST и измеряетсяс использованием бихроматического (340, 700 нм) метода. Хранить при: 2–8°С. Запечатанные или негидратированные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0–1000 ЕД/л. В упаковке 360 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
5	CREA - Creatinine 4 Flexes 480 (Реагент для определения креатинина 4 флекса 480) , набор	Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче. Измерение уровня креатинина используется при диагностике и лечении определенных заболеваний почек, при мониторинге гемодиализа и в качестве основы расчета для измерения других анализируемых веществ мочи. Методика основана на модифицированном кинетическом методе Яффе. В присутствии сильных оснований, например NaOH, пикрат вступает в реакцию с креатинином, формируя красный хромофор. Скорость повышения оптической плотности при 510 нм в связи с образованием хромофора прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется с использованием методики бихроматического режима (510, 600 нм). В целях предотвращения искажения результатов анализа билирубин окисляется феррицианидом калия. Все Реагенты находятся в жидкой форме и готовы к использованию. Хранить при: 2 – 8 °С. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке 3 дня для лунок 1 – 6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0,15 – 20,00 мг/дл [13 – 1768 мкмоль/л]. В упаковке 480 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть	набор	2	33 650	67 300	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		совместим с версией установленного программного обеспечения.					
6	GLUC - Glucose 4 Flexes 1440 (Реагент для определения глюкозы 4 флекса 1440), упак	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного измерения глюкозы в человеческой сыворотке, плазме, моче и спинномозговой жидкости. Состав:HK 15 ЕД/мл,G-6-PDH,NAD,АТФ,MG++,стабилизатор,буферный раствор.Принцип процедуры: гексокиназа (HK — Hexokinase) катализирует фосфорилирование глюкозы в присутствии аденозин-5'-трифосфата (АТФ) и магния, в результате чего образуются глюкозо-6-фосфат (G-6-P) и аденозиндифосфат (АДФ). Затем G-6-P окисляется глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой (G-6-PDH) в присутствии никотинамидадениндинуклеотида с образованием 6-фосфоглюконата и NADH. На каждый моль присутствующей глюкозы один моль NAD восстанавливается до одного моля NADH. Оптическая плотность, обусловленная NADH (и, следовательно, концентрация глюкозы) определяется бихроматически с конечной точкой (340 и 383 нм). Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 42 дней. Стабильность в открытой лунке: 7 дней для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0–500 мг/дл [0–27,8 ммоль/л]. В упаковке 1440 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	упак	1	128 800	128 800	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
7	AMY - Alpha-Amylase 4 Flexes 240 (Реагент для определения альфа амилазы 4 флекса 240), упак	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения активности амилазы в человеческой сыворотке, плазме и моче. Состав:2-хлоро-4-нитрофенил-мальтотриозид (CNPG3).Принцип процедуры: α-амилаза (α-1,4-глюкан-4-глюкангидролаза; EC 3.2.1.1) катализирует гидролиз определенного синтетического субстрата (2-хлоро-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид; CNPG3), в результате чего формируются 2-хлоро-4-	упак	1	90 500	90 500	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		нитрофенол (CNP),2-хлоро-4-нитрофенил-α-D-мальтозид (CNPG2), мальтотриоза (G3) и глюкоза. Оптическая плотность измеряется после инкубации в течение 70 секунд при 37°C и образования2-хлоро-4-нитрофенола (CNP) с использованием бихроматического (405, 577 нм) метода. Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0–650 ЕД/л. В упаковке 240 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
8	CHOL - Cholesterol 8 Flexes 480 (Реагент для определения холестерола 4 флекса 480), набор	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного измерения общего холестерина в человеческой сыворотке и плазме. Принцип процедуры: Холестеринэстераза катализирует гидролиз эфиров холестерина с образованием свободного холестерина, который вместе с имеющимся свободным холестерином окисляется в реакции, катализируемой холестериноксидазой, образуя холест-4-ин-3-он и пероксид водорода. В присутствии пероксидазы хрена образовавшийся таким образом пероксид водорода используется для окисления N,N-диэтиланилин-HCl/4-аминоантипирина для получения хромофора, который поглощает излучение при длине волны 540 нм. Оптическая плотность, обусловленная окисленным DEA-HCl/AAP, прямо пропорциональна концентрации общего холестерина и измеряется полихроматически с конечной точкой (452, 540, 700 нм). Реагенты CO 0,1 ЕД/мл Микроорганизмы HPO 2,4 ЕД/мл Растения 1–3 Таблетка с AAP 4,5 мкмоль.Буферный раствор Холат 4–6 Жидкость DEA 5,8 мкмоль.Хранить при: 2–8°C. Стабильность в открытой лунке: 5 дней для лунок 1–6 Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 50–600 мг/дл [1,3–15,5 ммоль/л]. Аналитическая чувствительность: 50 мг/дл [1,3 ммоль/л]. В	набор	1	60 500	60 500	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		упаковке 480 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
9	AHDL - HDL-Cholesterol 8 Flexes 240 (Реагент для определения ЛПВП 4 флекса 240), упак	Диагностический тест in vitro для количественного измерения холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-С) в человеческой сыворотке и плазме. Измерения ЛПВП-С используются в качестве вспомогательного средства при диагностике нарушений липидного обмена (например, сахарного диабета), различных заболеваний печени и почек и оценке риска развития атеросклерозаи сердечно-сосудистых заболеваний. Принцип процедуры: Анализ AHDL призван напрямую измерять уровни ЛПВП-холестерина без необходимости в предварительной обработке образцов или специальном центрифугировании;в методе используются два Реагента. В первой реакции хиломикроны, ЛПОНП и ЛПНП образуют растворимые в воде комплексы с сульфатом декстрана в присутствии сульфата магния. Эти комплексы устойчивы к воздействию модифицированных полиэтиленгликолем (PEG — polyethyleneglycol) холестеринэстеразы и холестериноксидазы, реагирующих с ЛПВП-холестерином. В присутствии кислорода ЛПВП-холестерин окисляется до Δ4-холестенона и пероксида водорода. Образовавшийся пероксид водорода затем вступает в реакцию с 4-аминоантипирином N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилином (HSDA) натрия в присутствии пероксидазы с образованием окрашенного раствора, измеряемого бихроматически с конечно йточкой (600/700 нм). Интенсивность окраски прямо пропорциональна концентрации ЛПВП-Св сыворотке. Все Реагенты находятся в жидкой форме и готовы к использованию. Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки остаются стабильными в анализаторе на протяжении30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–3,10 дней для лунки 4, 15 дней для лунок 5–6.Предел чувствительности15: 3 мг/дл [0,08 ммоль/л]. В упаковке 240 тестов.Для выявления	упак	1	115 000	115 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
10	ALDL - LDL-Cholesterol 4 Flexes 120 (Реагент для определения ЛПНП 4 флекса 120) , упак	Тест, предназначенный для количественного определения холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у человека, сыворотка и плазма. Измерения LDL-C используются в диагностике и лечении липидных нарушений, таких как как сахарный диабет, атеросклероз, а также различные заболевания печени и почек. Состав: реагент 1: буфер MES,холестеринэстераза,холестериноксидаза,пероксидаза,4-аминоантипирин (4-AA),оксидаза аскорбиновой кислоты,детергент,консервант. Реагент 2: жидкий буфер MES, детергент, DSBmTb, консервант. Принципы процедуры: Анализ холестерина ЛПОНП — это гомогенный метод прямого измерения уровней ХС-ЛПНП у человека. сыворотка или плазма без необходимости предварительной обработки или центрифугирования в автономном режиме. Нерастворимые LDL-C, VLDL-C, HDL-C, хиломикроны. Реагенты жидкие и готовы к использованию. Хранить при: 2–8 °C. Стабильность в открытой лунке: 5 дней для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (AMR): 5–300 мг / дл [0,13–7,8 ммоль / л]. Интерференция Билирубин (неконъюгированный) 80 мг / дл [1368 мкмоль / л] снизит результат ALDL на 124 мг / дл [3,2 ммоль / л] на 10%. Липемия 3000 мг / дл [33,9 ммоль / л] снизит результат ALDL на 122 мг / дл [3,2 ммоль / л] на 19%. Чувствительность метода ALDL составляет 5 мг / дл [0,13 ммоль / л] и представляет собой самую низкую концентрацию. LDL-C, который можно отличить от нуля. Эта чувствительность определяется как концентрация при двухстандартные отклонения выше среднего (n = 20) Калибратора ALDL уровня 1 (0 мг / дл) [0 ммоль / л]. В упаковке 120 тестов.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования,	упак	1	97 000	97 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.					
11	Картириджи для кювет 1 картридж 12000, упак	Кюветный картридж с пленкой, упаковка на 12 000 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	упак	6	160 000	960 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
Коагулометр Ca 600							
12	Растворы: чистящий CA Clean I 1 x 50мл	Моющий раствор используется для промывки наконечника для образца и реагента.Тип реагента: детергент. Концентрация гипохлорита натрия не более 1%.Форма выпуска: готовый раствор. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 50 мл.Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.	упак	10	62 000	620 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
Реактивы для автоматического гематологического анализатора Abbot CELL-DYN Ruby							
13	1H73-01	Дилюент/фокусирующий реагент Reagent, Diluent/Sheath 20 л	Упак -20л	2	200 200	400 400	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
14	03H80-02	Безцианидный лизирующий реагент для гемоглобина/оптического подсчета ядер Reagent, CN Free HGB / NOC Lyse	Наб- 3,8 л	2	210 000	420 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

15	99644	Энзиматический очиститель CD Enzymatic cleaner	2x50 ml	1	432 000	432 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
16	08H52-01	Лизирующий лейкоцитарный реагент Reagent, WBC Lyse	Упак -3,8л	6	131 600	789 600	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
		Реактивы для MicroCC 20Plus					
17	502-160-KZ	Изотонический разбавитель (Дилюент) (Micro CC20 Plus)	Упак- 20 л	2	59 350	118 700	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
18	HT-HEMA-11-81-KZ	Лизирующий Раствор, HTI MicroCC-20Plus	Упаков-1л	2	69 760	139 520	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
19	HT-HEMA-00-41-KZ	Ферментативный очиститель	Ураков-1л	6	44 000	264 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
	Итого:						**5 494 320,00**

В общем сумма по объявлению: ***5 494 320,00 (Пять миллионов четыресто девяносто четыре тысяч тристо двацать) тенге, 00 тиын***

Директор **Ергалиева Н. А.**