Приложение 4 к правилам организации ипроведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий испециализированных лечебных продуктов в рамках гарантированногообъема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объемамедицинской помощи для лиц, содержащихся в следственныхизоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной)системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательногосоциального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Объявление № 10
о закупе способом запроса ценовых предложений медицинского изделие лекарственных средств и т. д. на 2023 год

г. Атырау **29.06.2023 г.**

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2023 год в соответствии с Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий

№ лота	Наименование	Кр. описание	Ед. изм.	Общее кол-во	Цена объявл.	Общая сумма	График поставок
1	TP - Total Protein 4 Flexes 480 (Реагент для определения общего белка 4 флекса 480)	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного измерения общего белка в человеческой сыворотке и гепаринизированной плазме. Измерение общего белка используется при диагностике и лечении различных заболеваний, включая заболевания печени, почек и костного мозга, а также нарушения обмена веществ и метаболизма. Принцип процедуры: ион железа (Cu++) вступает в реакцию с пептидными связями (-C-NH-CH-C-NH-) белка в основном растворе. Количество образовавшегося комплекса белка с медным купоросом (II) пропорционально концентрации общего белка в образце и	Упак	6	44590	267 540	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		измеряется бихроматически с конечной точкой (540, 700 нм). Состав: Тартрат натрия-калия 1,089 г/мл, NaOH, Меди сульфат 0,015 моль/л. Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе напротяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 5 дней для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 2,0–12,0 г/дл [20–120 г/л]. Интерференция: Декстран 40 при 1500 мг/дл [375 мкмоль/л] завышает результат ТР 7,0 г/дл [70 г/л] на 17 %. Иммуноглобулин G при 2,5 г/дл [25 г/л] завышает результат ТР 7,0 г/дл [70 г/л] на 25 %. При использовании стандартного объема образца (15 мкл):Гемоглобин (гемолизат) при 500 мг/дл [0,31 ммоль/л] (мономер) завышает результат ТР3,9 г/дл [39 г/л] на 11 % .Билирубин (непрямой) при 20 мг/дл [342 мкмоль/л] занижает результат ТР 3,8 г/дл [38 г/л] на -11 %. Липемия при 600 мг/дл [6,78 ммоль/л] и выше вызывает появление флага ошибки анализа, поэтому величина интерференции недоступна. В упаковке 480 тестов.					
2	ALB – Albumin 4 Flexes 480 (Реагент для определения альбумина 4 флекса 480)	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения альбумина в человеческой сыворотке, гепаринизированной плазме и моче. Принцип процедуры: в присутствии растворяющего вещества BCP связывается с альбумином при pH 4,9. Количество комплексов «альбумин — BCP» прямо пропорционально концентрации альбумина. Комплекс поглощает свет при 600 нм и измеряется полихроматически с конечной точкой (600, 540, 700 нм). Хранить при: 2–8°C. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0,6–8,0 г/дл [6–80 г/л]. В упаковке 480 тестов.	Упак	6	48 200	289 200	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
3	CREA – Creatinine 4 Flexes 480 (Реагент для определения креатинина 4 флекса 480)	Предназначен для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме или моче. Измерение уровня креатинина используется при диагностике и лечении определенных заболеваний почек, при мониторинге гемодиализа и в качестве основы расчета для измерения других анализируемых веществ мочи. Методика основана на модифицированном кинетическом методе Яффе. В присутствии сильных оснований, например NaOH, пикрат вступает в реакцию с креатинином, формируя красный хромофор. Скорость повышения оптической плотности при	Упак	6	33 500	201 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

	ис еа ци от ис. ид °(з а в ес ь/	510 нм в связи с образованием хромофора прямо пропорциональна концентрации креатинина в образце и измеряется с использованием методики бихроматического режима (510, 600 нм). В целях предотвращения искажения результатов анализа билирубин окисляется феррицианидом калия. Все Реагенты находятся в жидкой форме и готовы к использованию. Хранить при: 2 – 8 °С. Запечатанные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке 3 дня для лунок 1 – 6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0,15 – 20,00 мг/дл [13 – 1768 мкмоль/л]. В упаковке 480 тестов.					
4	BUN - Urea Nitrogen 4 Flexes 480 (Реагент для определения азота мочи 4 флекса 480) уг де ни зо N с щ ги 2- ри яз ци й (тв	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения азота мочевины в человеческой сыворотке, плазме и моче. Принцип процедуры: уреаза специфически гидролизует мочевину с образованием аммиака и диоксида углерода. Аммиак используется ферментной глутаматдегидрогеназой (GLDH) для восстановительного аминирования α-кетоглутарата (α-KG)с одновременным окислением восстановленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH). Изменение оптической плотности при 340 нм в связи с исчезновением NADH прямо пропорционально концентрации BUN в образце и измеряется с использованием бихроматического (340, 383 нм) метода. Хранить при: 2–8°С. Запечатанные или негидратированные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 5 дней для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0–150 мг/дл [0–53,5 ммоль/л]. Аналитическая чувствительность: 1 мг/дл. В упаковке 480 тестов.	Упак	6	44 500	267 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
5	ALT - ALT/GPT 4 Flexes 240 (Реагент для определения ALT/GPT 4 флекса 240) че уд тр гL ем ос	Диагностический тест in vitro для количественного измерения активности аланинаминотрансферазы в человеческой сыворотке или плазме на биохимическом анализаторе. Измерения аланинаминотрансферазы используются при диагностике и лечении определенных заболеваний печени и сердечно-сосудистых заболеваний. Принцип процедуры: Аланинаминотрансфераза катализирует трансаминирование отL-аланина к α-кетоглутарату (α-KG) с образованием L-глутамата и пирувата. Формируемый пируват восстанавливается до	Упак	7	22 200	155 400	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		лактата лактатдегидрогеназой с одновременным окислением восстановленного никотинамидадениндинуклеотида. Изменение оптической плотности прямо пропорционально активности аланинаминотрансферазы и измеряется с использованием бихроматического(340, 700 нм) метода. Хранить при: 2–8°С. Запечатанные или негидратированные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6, 30 дней для лунок 7–8. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 6–1000 ЕД/л [0,10–16,70 мккат/л]. В упаковке 240 тестов.					
6	AST - AST/GOT 4 Flexes 360 (Реагент для определения AST/GOT 4 флекса 360)	Диагностический тест in vitro, предназначенный для количественного определения активности аспартатаминотрансферазы в человеческой сыворотке или плазме. Принцип процедуры: Аспартатаминотрансфераза (AST) катализирует трансаминирование от L-аспартата к α-кетоглутарату с образованием L-глутамата и оксалоацетата. Образовавшийся оксалоацетат восстанавливается до малата малатдегидрогеназой с одновременным окислением восстановленного никотинамидадениндинуклеотида (NADH). Изменение оптической плотности во времени вследствие преобразования NADH в NAD прямо пропорционально активности AST и измеряетсяс использованием бихроматического (340, 700 нм) метода. Хранить при: 2–8°С. Запечатанные или негидратированные лунки картриджа остаются стабильными в анализаторе на протяжении 30 дней. Стабильность в открытой лунке: 3 дня для лунок 1–6. Диапазон аналитических измерений (ДАИ): 0–1000 ЕД/л. В упаковке 360 тестов.	Упак	7	33 500	234 500	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
Реактивы для автоматического гематологического анализатора Abbot CELL-DYN Ruby							
7	1H73-01	Дилюент/фокусирующий реагент Reagent, Diluent/Sheath	20 л	6	200 200	1 201 200	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
8	03H80-02	Безцианидный лизирующий реагент для гемоглобина/оптического подсчета ядер Reagent, CN Free HGB / NOC Lyse	3,8 л	2	210 000	420 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
9	99644	Энзиматический очиститель CD Enzymatic cleaner	2x50 m	1	432 600	432 600	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика

		Реактивы для MicroCC 20Plus					
10	502-160-KZ	Изотонический разбавитель (Диluent) (Micro CC20 Plus)	20 л.	2	59 350	118 700	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
11	HT-HEMA-11-81-KZ	Лизирующий Раствор, HTI MicroCC-20Plus	1 л	4	69 760	279 040	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
12	HT-HEMA-00-41-KZ	Ферментативный очиститель	1 л	10	44 000	440 000	В течение 15 рабочих дней по заявке заказчика
	Итого:						**4 306 180,00**

Месторасположение заказчика, организатора закупа: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412.
Товар поставляется: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412, КГП на ПХВ «Атырауская областная больница №2» УЗ АО.
Сроки и условия поставки: согласно графика договора закупа, на условиях DDP, по ИНКОТЕРМС 2020.
Место представления и окончательный срок подачи ценовых предложений (документов) от потенциальных поставщиков: г. Атырау, проспект Бейбарыс, 412 (здание КГП на ПХВ «Атырауская областная больница№2» УЗ АО, административный корпус, 3 этаж), прием по 05.07.2023 г., до 11:30 ч включительно.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями (заявками): 05.07.2023 г., в 11:30 ч, в кабинете отдел гос. закуп.

Конверт должен содержать ценовые предложения, разрешение, подтверждающее права потенциального поставщика на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемых разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

На конверте должно быть указано:

1) Полное наименование потенциального поставщика;
2) Юридический и фактический адреса потенциального поставщика;
3) Номер телефона (ов);
4) На конверте также должно быть прописано: «По объявлению ЗЦП № 10 от 29.06.2023 г.»

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой его выражения согласия осуществить поставку с соблюдением условий настоящего запроса. Представляемые расходные материалы и медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в настоящем запросе (объявлении).

Директор **Ергалиева Н. А**